

FARVEL FLÅTER!

Lopper, loppelarver og myg



ET DRYP - 4 VIRKNINGER:



BAYVANTIC® Vet. mod flåter

Frastøder og dræber flåter, inden de når ind i pelsen og bider sig fast. Den behandlede hund bærer ikke flåter med hjem til familien efter en rask tur i skov og eng. De allerfleste flåter bliver ude i naturen, hvor de hører til. BAYVANTIC® reducerer derfor risikoen for overførsel af sygdomme fra flåter.



BAYVANTIC® Vet. mod loppelarver

Dræber loppelarverne i hundens nære omgivelser. Hudskæl, som drysser af den behandlede hund, tilfører omgivelserne minimale mængder BAYVANTIC®. Loppelarver er meget følsomme over for BAYVANTIC® og dør, når de kommer i kontakt med hudskæl fra den behandlede hund i hundekurven, i tæpper, i bilen m.v. BAYVANTIC® sætter derfor en stopper for "loppecirkus" i den behandlede hunds nære omgivelser.

BAYVANTIC® Vet. fås på apoteket, hos dyrlægen samt øvrige v-mrk. forhandlere.



BAYVANTIC® Vet. mod lopper

Dræber voksne lopper, når de springer på hunden. De allerfleste lopper når ikke at suge blod. BAYVANTIC® beskytter derfor hunden mod generne ved loppebid: kløe og loppeallergi, og sætter en stopper for udvikling af "loppecirkus" i den behandlede hunds omgivelser.



BAYVANTIC® Vet. mod myg

Frastøder og dræber myg og sandfluer. BAYVANTIC® beskytter derfor hunden mod generne ved at blive stukket. Især myggenes forkærlighed for at stikke hunden i ansigtet kan være en plage. Sandfluer er stikfluer, der findes i troperne, hvor de overfører visse sygdomme til hunde (og mennesker).

Besøg også vores hjemmeside - www.bayvantic.dk



Må ikke bruges til katte



VÆRNER OM DIN HUND

Bayvantic® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin).

Indikation: Til behandling og forebyggelse af loppe- og flåtangreb hos hund. Afskrækkende (repellerende) effekt mod flåter og myg. Kan indgå i behandling af loppeallergi. **Administrationsmåde:** Kun til brug på huden. Dosering hund: 1,5-4 kg: 1 pipette á 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette á 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette á 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette á 4,0 ml. En behandling forebygger nye loppe- og flåtangreb i 3-4 uger. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer. **Bivirkninger:** I sjældne tilfælde kan ses hudreaktioner, såsom kløe, rødme og hårtab på applikationsstedet samt sløvhed. For yderligere information læs indlægssedlen. **Drægtighed og diegivning:** Kan anvendes under drægtighed og laktation. **Forsigtighedsregler:** Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. **Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet:** Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brug. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat. Hvis præparatet kommer i øjnene ved uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen til lægen, hvis hud- og øjenirritationer vedvarer, eller hvis præparatet ved et uheld sluges. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. **Andre informationer:** Opløsningsmidlet i Bayvantic® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades. **Pakninger:** Bayvantic® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml - 4,0 ml. **Udl:** HV. **Tlf:** 4523 5000 - **Fax:** 4523 5257.



Hvad er skab?

I disse år er rævepopulationen kraftigt angrebet af skab, hvilket har medført en kraftig reduktion i antallet af ræve i dele af landet, bl.a. Bornholm. Da denne variant af skabmiden også kan angribe hunde, har dette medført, at diagnosen skab hos hunde med hudlidelser er blevet kraftigt øget

Tekst og fotos: Dyrlæge Mogens Hansen

Skab (*Sarcoptes scabiei*) forårsages af en lille (0,3 mm) mide, som kan optræde på en lang række pattedyr, herunder mennesket, hvor det kendes under navnet fnat.

Hvordan er livscyklus hos skabmiden?

Skabmiden lever hele deres liv i de yderste hudlag, hvor den graver gange og former sig. Æggene bliver lagt i disse gange og udvikler sig her til voksne mider over forskellige larve- og nymfstadier. Hos rævne, som jo ikke får behandling for denne lidelse, kan der være op til 2 millioner mider i huden. Dette medfører så ulidelig en kløe, at rævens fødesøgning forstyrres og afmagrer. Samtidig bliver hud og pels ødelagt, og efterhånden er huden en stor væskende og betændt overflade uden pels, hvor der er et stort væsketab fra. Denne tilstand vil efterhånden medføre rævens død. Hos gadehunde kan man se de samme problemer som hos rævne. Da vores hunde er under konstant opsyn, vil denne tilstand ikke udvikle sig så slemt, da man som ansvarlig hundeejer selvfølgelig vil kontakte sin dyrlæge, når der er problemer.

Hvad er symptomerne på skab?

Det mest karakteristiske symptom hos hunde med skab er en voldsom kløe. Hudforandringerne, som typisk viser sig som tørre, hårløse, fortykkede og skællende områder, vil især være på ører, albuer, bryst, bug og benene. Da hunden kløer sig meget, og dermed laver yderligere beskadigelse af huden, kan der komme betændelse, som vil vise sig ved væskende, varme og gullige hudområder. I nogle tilfælde kan man som eneste symptom se kløe uden påviselige hudforandringer.

Hvordan smitter skab?

Den hyppigste årsag er kontakt med smittede ræve eller hunde, enten direkte eller ved kontakt med hudflager fra et smittet dyr. Smitterisiko er størst ved høje temperaturer, typisk i sommerhalvåret. Mennesker kan også smittes med denne type skab, men kun sjældent og det viser sig typisk ved lidt kløe og rødmen på hænderne.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen skab?

I dag kan man ved hjælp af en blodprøve påvise antistoffer mod

skabmiden, hvilket har gjort diagnosticeringen meget lettere. Før i tiden tog man hudskrab, som så blev mikroskopert. Men selv ved mange hudskrab var det ikke i alle tilfælde, at man fandt mider. Derfor var behandlingen før i tiden i mange tilfælde baseret på de kliniske symptomer.

Hvad kan du gøre som hundeejer?

Da skab smitter ved kontakt til ræve, bør man holde sin hund fra rævens levesteder. Dette vil også nedsætte risikoen for udbredelse af hjerte- og lungeorm (se artikel andet sted i magasinet) Dette kan dog i mange tilfælde være besværligt, da der er mange ræve i byområderne. Derfor bør man kontakte sin dyrlæge ved tegn på hudproblemer, især hvis hunden kløer sig, da der er mange tilfælde, hvor dette er det eneste symptom. Hvis din hund får konstateret skab, bør du informere andre hundeejere, hvor din hund har været i kontakt med deres hunde. Samtidig må du ikke lade din hund komme i kontakt med andre dyr, før at behandlingen er fuldført.

Hvordan behandles skab?

Hvor man før var henvist til at vaske hunden, er der her i 2005 kommet nye midler på markedet, som blot skal dryppes på huden, og som virker i en måned, fuldstændigt efter samme princip som loppe- og flåtmidlerne. Der kan blive tale om at foretage supplerende behandling alt efter hudforandringernes karakter: antibiotikabehandling ved hudbetændelse, kløestillende behandling ved kraftig kløe samt immunstimulerende og hudopbyggende behandling med naturprodukter og plejende shampoo.

